Tabla 1. Estudios seleccionados* por tipo de transición perioperatoria de atención médica. Referencia Criterios de medición/metodología Transferencias intraoperatorias de turno a turno: médicos clínicos con funciones clínicas similares ofrecen relevo permanente Estudios que evalúan resultados de los pacientes a largo plazo Saager et al.7 (2014) Transferencias intraoperatorias relacionadas con el aumento en la Análisis retrospectivo de bases de datos de un solo centro. Resultado morbilidad/mortalidad en una forma dependiente de la dosis. compuesto de morbilidad importante y mortalidad. Hudson et al.9 (2015) Análisis retrospectivo de bases de datos de un solo centro. Solo Transferencias intraoperatorias relacionadas con el aumento en la morbilidad/mortalidad en una forma dependiente de la dosis. mortalidad v resultado compuesto de morbilidad importante v mortalidad. Hyder et al.8 (2016) Análisis retrospectivo de pacientes de cirugía colorrectal de un solo Transferencias intraoperatorias relacionadas con el aumento en la morbilidad/mortalidad en una forma dependiente de la dosis. centro. Resultado compuesto de morbilidad importante y mortalidad. Terekhov et al.¹⁰ (2016) No hay relación entre las transferencias intraoperatorias de fin de Análisis retrospectivo de bases de datos de un solo centro. Resultado compuesto de morbilidad importante y mortalidad turno y la morbilidad/mortalidad. Recesos cortos relacionados con resultados mejorados Estudios de intervención previa y posterior Boat y Spaeth¹² (2013) Meiora en la confiabilidad de la transferencia intraoperatoria de Desarrollo e implementación interprofesional de listas de verificación

Relevo de tareas/receso intraoperatorio: los médicos clínicos con funciones clínicas similares ofrecen relevo de corto plazo (<1 hora) con la

utilizando la metodología de mejora de la calidad.

plastificada para las transferencias intraoperatorias

compuesto de morbilidad importante y mortalidad

utilizando la metodología de mejora de la calidad.

la transferencia basada en AIMS.

anestesia.

cognitiva.

Desarrollo e implementación de una lista de control electrónica para

Análisis de >1000 incidentes críticos durante la atención médica de

Análisis retrospectivo de bases de datos de un solo centro. Resultado

Desarrollo e implementación interprofesional de listas de verificación

Intervención multimodal a gran escala que incluye formularios electrónicos de transferencia estandarizada, capacitación didáctica y

Transferencia de información previa a la transferencia, separación

explícita de equipos y transferencias de información, uso de ayuda

Plantilla estandarizada para la presentación de transferencias

verbales e implementación que incluye pruebas repetitivas de

Implementación del proceso estructurado de transferencia con

informes de admisión previa e información de la OR.

herramientas, educación y capacitación.

basada en simulación y comentarios sobre el rendimiento

Desarrollo, capacitación y presentación de una lista de control

responsable a responsable del 20 % al 100 % con el uso de la lista

Mejora en la transferencia y retención de información crítica.

discusión de inquietudes y percepción de la calidad general de la

Mejora del 43 % en la calidad de las transferencias observadas.

Recesos cortos asociados con la identificación de posibles áreas de

Recesos cortos asociados con una pequeña mejora (6,7 %) en los

Meiora en la confiabilidad de la transferencia de la PACU del 59 %

Mejora en las transferencias aceptables del 3 % al 87 % a los tres

Transición posoperatoria de la atención médica de la sala de operaciones a la unidad de cuidados intensivos

Reducción del 42 % en errores técnicos y reducción del 49 % en

Reducción del 75 % en errores técnicos y reducción del 62 % en

Mejora significativa en la preparación previa del paciente, la

preparación previa a la transferencia, la transferencia de

años posteriores al inicio del programa de mejora.

Transición posoperatoria de la atención médica de la sala de operaciones a la unidad de atención posterior a la anestesia

de control.

expectativa de que el primer médico clínico regresará

comunicación de la transferencia.

inquietud o cuasiaccidentes.

resultados de los pacientes.

omisiones de información.

omisiones de información crítica

información y la percepción del personal.

a más de 90 %.

Agarwala et al.11 (2015)

Jullia et al.13 (2017)

Cooper⁵ (1989)

Terekhov et al.10 (2016)

Boat v Spaeth¹² (2013)

Weinger et al.14 (2015)

Catchpole et al.16

Joy et al.15 (2011)

Craig et al. 17 (2012)

(2007)